

نشریه علمی- ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
جلد ۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۵

نقش و اهمیت گرده‌افشانی و گرده افشاران‌ها در کشاورزی (بخش اول)

فرنگیس قواتی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۱۰

چکیده

قنواتی ف (۱۳۹۵) نقش و اهمیت گرده‌افشانی و گرده افشاران‌ها در کشاورزی (بخش اول). نشریه علمی- ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی (۱) (۱۵)-۱۱.

گرده‌افشانی یک فرایند کلیدی در اکوسیستم‌های گیاهی طبیعی و کشاورزی است، بنابراین در تولید غذا و معیشت انسان که واپسگی مستقیم به اکوسیستم‌های طبیعی و سیستم‌های تولید کشاورزی دارد نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید. یک سوم مواد غذایی مورد استفاده انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان تأمین می‌شود که به گرده‌افشانی حشرات واپس‌هستند. در جهان، بیش از سه هزار گونه گیاهی به عنوان غذا استفاده شده‌اند که اکنون تنها ۳۰۰ گونه از آن‌ها به عنوان غذا کشت می‌شوند و تنها ۱۲ گونه، حدود ۹۰ درصد غذای مصرفی جهان را تشکیل می‌دهند. اکثر گونه‌های گیاهان گلدار تنها هنگامی بذر تولید می‌کنند که گرده افشاران‌های جانوری، دانه گرده را از بساک به کلاله گل‌های آنها منتقل کنند. علاوه بر گیاهان، تنوع زیستی جانوران نیز که از میوه‌ها و بذور تقدیمه می‌کنند واپس‌هست به گرده‌افشان‌ها می‌باشد. بدون این فرآیند ارتباط بسیاری از گونه‌های واپس‌های از هم می‌پاشد. به این ترتیب گرده افشاران‌ها علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، در حفظ تنوع زیستی نیز بسیار مهم می‌باشند. در این بررسی به نوع رفتار تولیدمثبتی و مکانیسم‌های کنترل گرده‌افشانی جهت احیاء، و تولید بذر محصولات کشاورزی مهم (گیاهان زراعی) پرداخته شد.

واژه‌های کلیدی: اهمیت اقتصادی، گرده‌افشانی و محصولات زراعی.

مقدمه

ارزش دیگر گردهافشانی به خاطر تأثیر آن روی کیفیت و کارایی تولید محصول است. گردهافشانی ناکافی نه تنها می‌تواند موجب محصول کمتر شود، بلکه موجب محصول دیررس و درصد بالای میوه نامرغوب خواهد شد. در این رابطه به تولید کنندگان هشدار داده شد که «آن‌ها ممکن است کود بدهند، خاک را شخم بزنند، هرس کنند، درختان را تک و سم‌پاشی کنند و در یک کلام همه آنچه را که عملیات کشاورزی مدرن توصیه می‌کند، انجام دهنند، اما بدون عوامل گردهافشانی برای انتقال گرده از پرچم به مادگی گل که مهم‌ترین آن‌ها زنبور عسل است، ممکن است باردهی باشکست مواجه شود». با گردهافشانی فراوان، تولید کنندگان ممکن است قادر باشند که محصول خود را قبل از این که یخندهان آسیب بزنند به گل بنشانند، محصول خود را قبل از حمله حشرات به بار بنشانند و قبل از هوای نامساعد محصول خود را برداشت کنند. زودرسی معمولاً نادیده گرفته می‌شود؛ اما مرحله مهمی در اقتصاد محصول است (۲۲).

در این بررسی ضمن پرداختن به گروه‌های مختلف گرده افشارها و تعامل آنها با گیاهان و ارزش اقتصادی گردهافشانها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و جهانی برای حفاظت ذخایر ژنتیکی گردهافشان، نوع رفتار تولید مثالی و مکانیسم‌های کنترل گردهافشانی جهت احیاء، و تولید بذر محصولات کشاورزی مهم (گیاهان زراعی) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

حدود ۲۴۰۰۰۰ گونه گیاهان گلدار برای گردهافشانی به ۱۰۰۰۰۰ گونه دیگر حشرات و جانوران وابسته هستند. در مقایسه با گیاهانی که با گردهافشان‌های جانوری تلقیح می‌شوند، معمولاً گیاهانی که توسط باد گردهافشانی می‌شوند از تنوع کمتری برخوردار هستند (۱۹). یک سوم مواد غذایی مورد استفاده انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان تامین می‌شود که به گردهافشانی حشرات وابسته هستند. در جهان، بیش از سه هزار گونه گیاهی به عنوان غذا استفاده شده‌اند که اکنون تنها ۳۰۰ گونه از آن‌ها به عنوان غذا کشت داده می‌شوند و تنها ۱۲ گونه حدود ۹۰ درصد غذای مصرفی جهان را تشکیل می‌دهند. این ۱۲ گونه شامل غلات (دانه‌ها): برنج، گندم، ذرت، سورگوم، ارزن، چاودار، جو، سیب‌زمینی، و سیب‌زمینی شیرین، موز و نارگیل است (۱۹). از طرف دیگر محصولات حیوانی مورد مصرفی بشر قرار می‌گیرند که قسمت مهمی از رژیم غذایی جهان را تشکیل می‌دهند این محصولات عبارتند از گوشت گاو و گوسفند و لبیات که در نتیجه مصرف گیاهانی که به وسیله حشرات گردهافشانی شده‌اند از قبیل یونجه، شبدر و دانه‌های روغنی مختلفی می‌شود. با توجه به توضیحات فوق و بررسی آمارهای موجود چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد کل رژیم غذایی بشر به طور مستقیم و غیر مستقیم به وجود حشرات گردهافشان بستگی دارد (۱۹).

غالباً مستقیم و در پروانه آساهای چندساله یا درختی در بیشتر موارد غیرمستقیم است (۵).

علل و عوامل گردهافشانی غیرمستقیم
در طبیعت به جز موارد محدود یاد شده، کلاله در بسیاری از گل‌ها پذیرای دانه گرده گل‌های پایه‌های دیگر است. در مواردی نیز لقادیر غیرمستقیم برای باروری گیاه امری اجباری است، مثلاً در گیاهان زیر گردهافشانی غیرمستقیم امری الزامی است.

- ۱- گیاهانی که گل‌های تک جنسی دارند.
- ۲- گل‌هایی که اندام‌های جنسی نر و ماده آنها در یک زمان نمی‌رسند و دیکوگام هستند.
- حالت پروتوندری (تقدم پرچم‌ها) در این گلها گردهافشانی قبل از رسیدن تخمک‌های گل پایان می‌گیرد.
- حالت پروتوژنی (تقدم مادگی) در این گلها تخمک‌ها قبل از گرده می‌رسند و به عبارت دیگر وقتی تخمک‌ها آماده لقادیر می‌شوند، هنوز دانه‌های گرده آن گل در مرحله تشکیل‌اند.
- ۳- گیاهانی که وضع خاص و ساختار گل آنها به دانه گرده همان گل امکان نمی‌دهد تا مستقیم روی کلاله همان گل قرار گیرد و به اصطلاح گیاهان کرکوگام هستند. مثل تیره ثعلب و زنبق. نوع خاصی از کرکوگام که به آن ناجورخامه (هترواستیله) می‌گویند در خانواده پامچال، زیتون و روناس دیده می‌شود.
- ۴- گیاهانی که دانه‌های گرده گل نسبت به

گرده افشاری

انتقال دانه گرده را روی کلاله مادگی، گرده افشاری می‌گویند. در گل‌های هرمافروdit اگر گرده یک گل روی کلاله همان گل تندش یابد، گردهافشانی را مستقیم ولی اگر دانه گرده یک گل روی کلاله گل دیگر تندش نماید، گردهافشانی را غیرمستقیم می‌گویند. گردهافشانی مستقیم را در اصطلاح، خودگشنسی (اتوگامی) و حالت غیرمستقیم آن را دگرگشنسی (هتروگامی) می‌گویند (۵).

علل و عوامل گردهافشانی مستقیم

- ۱- همزمانی گردهافشانی (رهاشدن دانه‌های گرده از بساک پرچم‌ها) با آمادگی کلاله برای پذیرش دانه‌های گرده.
- ۲- حرکات طبیعی پرچم‌ها (مانند گیاهان تیره گزنه) و حرکات گل توسط باد و حشرات که سبب می‌شود تا دانه‌های گرده یک گل روی کلاله همان گل قرار گیرند.
- ۳- در بعضی از گیاهان گل تا قبل از عمل لقادیر ناشکفته و بسته باقی می‌ماند. بنابراین لقادیر مستقیم در چنین گل‌هایی تنها راه باروری گیاه است. لقادیر در گل‌های ناشکفته کلیستوگامی و گیاه دارای چنین لقادیری را کلیستوگام می‌گویند.
- ۴- در برخی از گیاهان، گردهافشانی مستقیم امکان پذیر است، اما الزامی نیست. مثلاً در عده‌ای از گیاهان یک ساله و علفی تیره نخود که گل‌های پروانه آسا دارند گردهافشانی

حافظت و ارتقاء تنوع زیستی و حیات روی زمین است. تنها بعد از گردهافشانی است که گیاه قادر به تولید بذر و میوه است. گیاهان برای تولید مثل خود به بذرهایشان متکی می‌باشند و میوه‌هایی از جمله کدو، موز، آلو، کادو، انجیر و گیلاس و دانه‌هایی از جمله سویا، لوبيا، بادام زمینی، فندق، کنجد غذای ضروری جانوران و انسان‌ها هستند. اکثر گیاهان علوفه‌ای مهم مانند یونجه و شبدر برای تولید بذر به گردهافشان‌ها نیازمندند. بنابراین نگهداری تنوع غذایی ما، از نظر گوشت نیز به نگهداری تنوع گیاهی و تنوع گردهافشان‌ها به عنوان تامین علوفه دام نیز ضروری است (۸).

نقش گردهافشان‌ها در امنیت غذایی

مطالعات جهانی در مورد میزان وابستگی محصولات کشاورزی که غذای بشر را تشکیل می‌دهند به گردهافشان‌ها، بر پایه آمار و اطلاعات FAO بیانگرایی مسئله است که ۳۵ درصد تولید محصولات جهانی به گردهافشان‌هایی مانند زنبورها، مگس‌ها، پروانه‌ها، شاپرک‌ها و سوسک‌ها وابسته هستند، اگرچه ۶۰ درصد محصولات غذایی جهانی مثل گندم، برنج و ذرت به گردهافشانی حشرات وابستگی ندارند ولی گردهافشان‌ها باعث افزایش تولید ۸۷ محصول غذایی اصلی جهانی می‌شوند. وابستگی پنج درصد دیگر گیاهان به گردهافشانی تاکنون شناخته نشده است (۱۶ و ۱۸).

کلاله همان گل عقیم است و به اصطلاح گیاهان خود عقیم (اتواستریل) هستند (۵).

گردهافشان‌ها

گردهافشان‌ها از اجزاء اصلی اکوسیستم‌ها به شمار می‌روند که در تولید مثل جنسی و دگرگردهافشانی بسیاری از گیاهان حائز اهمیت زیادی می‌باشند. آنها با افزایش امنیت غذایی و بهبود معیشت و از طریق نقشی که در حفاظت تنوع زیستی در اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی بازی می‌کنند، به امنیت و پایداری جوامع بشری یاری می‌رسانند. کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و کیفیت ظاهری آنها مانند تغییر شکل میوه‌ها بیش از آنکه ناشی از ناکارآمدی عوامل تولید، مثل مواد شیمیایی کشاورزی باشد ناشی از کاهش گردهافشانی مناسب است. در اکوسیستم‌های طبیعی، نشانه‌های قابل مشاهده کاهش گردهافشانی کمتر از اکوسیستم‌های کشاورزی به نظر می‌رسد، اما نتیجه و عواقب آن می‌تواند سخت‌تر باشد، بطوری که ممکن است باعث انقراض محلی یک گونه گیاهی، کاهش قابل ملاحظه میوه‌ها و دانه‌های خوراک حیوانات، کاهش پوشش‌های گیاهی و سرانجام اگر گونه‌های اصلی اکوسیستم در گیر باشند باعث مرگ اکوسیستم نیز بشود (۴ و ۱۷).

نقش گردهافشان‌ها در امنیت زیستی
گردهافشان‌ها یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های

ناشی از کاربرد حشره کش‌ها و مواد شیمیایی کشاورزی، کشاورزی تک محصولی و جنگل زدایی است (۱۶ و ۹).

برنامه‌ریزی و اقدامات جهانی برای حفظ تنوع گردهافشان‌ها

آگاهی از اکولوژی گردهافشان‌ها و زیست‌شناسی گیاهان گلدار اصلی‌ترین مسیر حفاظت تنوع زیستی می‌باشد. اعلام نگرانی دانشمندان سراسر جهان در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای کاهش تنوع گردهافشان‌ها موجب شد که سیاست گذاران محیط زیست و کشاورزی را به فعالیت و اداشت تا در پنجمین نشست مجمع عمومی Conference Of Parties (COP)، کنوانسیون تنوع زیستی Convention on Biological Diversity (CBD)، در سال ۲۰۰۰ یک توافق بین‌المللی برای حفاظت و استفاده پایدار از گردهافشان‌ها تحت عنوان International Pollinator Initiative (IPI) دست یابند، که به اعلانیه سائوپائولو مشهور شد. متعاقب آن دیرخانه CBD از سازمان کشاورزی و غذا (FAO) دعوت به همکاری نمود تا طرح عملیاتی برای IPI آماده سازد. این طرح عملیاتی که براساس توصیه اعلانیه سائوپائولو (COP6) VI/5 تهیه شد براساس تصمیم درسال ۲۰۰۲ پذیرفته شد. به دنبال آن توافق آفریقایی برای گردهافشان‌ها یکی از African Pollinator Initiative (API) اولین شبکه‌های منطقه‌ای بود که برای تسهیل

ارزش اقتصادی گردهافشان‌ها

یک سوم اقتصاد جهانی تولیدات کشاورزی امریکا به تماس حشرات با گل‌های گیاهان کشاورزی بستگی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که گردهافشانی توسط باد، در نواحی استوایی کمتر از گردهافشانی با حشرات است، می‌توان انتظار داشت که سهم جهانی برای اهمیت گردهافشان‌ها حتی بالاتر از این مقدار هم باشد. ارزش سالانه این سرویس تنها در امریکا در حدود ۸–۶ میلیارد دلار امریکا برآورد شده است (۲۰) و میزان جهانی ۷۰–۶۵ میلیارد دلار امریکا برآورد شده است (۲۲). بیشترین سهم مربوط به زنبورهاست که مسئول گردهافشانی ۷۳ درصد محصولات جهانی هستند، و اصلی‌ترین گونه آن که اهلی شده است، زنبور عسل یا گونه *Apis mellifera* می‌باشد. مهم‌ترین مشکل گردهافشانی تولیدات کشاورزی جهانی تکیه کردن به یک گونه منفرد است. اخیراً در بسیاری نقاط دنیا زنبورهای عسل دچار بیماری همه گیری شده‌اند که عامل آن کنه واروآ (*Varroa*) است. در امریکا در سال‌های گذشته جمیعت آنها به دلیل همین بیماری حدود یک سوم کاهش یافته است و به همین علت میوه‌ها و سبزیجات در امریکا و اروپا با وجود گلدهی مناسب به میزان زیادی کاهش یافته است. همچنین این بیماری به سرعت در حال گسترش در جهان می‌باشد و علاوه بر آن تعداد زنبورهای دیگر نیز رفته در حال کم شدن می‌باشند. این کاهش شدید،

راستای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از گردهافشان‌ها انجام تحقیقات پایه و ایجاد اطلاعات در زمینه موانع تاکسونومیک، نظارت بر تغییرات گردهافشان‌ها، عوامل موثر بر کاهش گردهافشان‌ها، ارزش اقتصادی گردهافشان‌ها، حفاظت و احیاء گردهافشان‌ها، استفاده پایدار گردهافشان‌ها ضرورت دارد (۱، ۲، ۳ و ۴).

حشرات گردهافشان عامل مهم زیستی در تنوع و پراکنش گیاهان

۱- کثرت و تنوع گیاهانی که گردهافشانی آنها بوسیله حشرات صورت می‌گیرد بهترین توجیه منطقی تاثیر حشرات در کثرت و تنوع این گیاهان و پراکنش وسیع آنهاست.

۲- تنوع و گسترش محدود گیاهانی که به علت داشتن گل‌های با ساختار خاص، حشرات گردهافشان محدود و یا منحصر بفرد دارند سبب شده است تا این گیاهان فقط در مناطقی که حشرات گردهافشان آنها وجود دارند قادر به تولید مثل جنسی و ایجاد بذر باشند (۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۳).

انواع حشرات گردهافشان

حشرات گردهخوار: این حشرات بیشتر از دانه‌های گرده گل تغذیه می‌کنند و گیاهان مورد علاقه آنها غالباً دارای گل‌های کاملاً باز با پرچم‌های بزرگ و مشخص، نظیر گل‌های گیاهان تیره خشخاش؛ گل راعی یا گل چای و بعضی از گیاهان تیره سیب‌زمینی هستند.

اجرای IPI تشکیل شد. در طرح‌های عملیاتی IPI اولویت تحقیقاتی، افزایش آگاهی و آموزش عمومی بویژه برای سیاست‌گذاران در نظر گرفته شد. حفاظت تنوع زیستی گردهافشان‌ها در مقیاس جهانی به همکاری همه جانبه مداخله گران از جمله طرفداران حفظ محیط زیست، کشاورزان، جنگل‌بانان، متخصصین علوم باگبانی، طرفداران حفظ خاک، معماران و طراحان شهری، سیاست‌گذاران و سایرین نیاز دارد (۴ و ۲۱).

رویکرد داخلی حفاظت گردهافشان‌ها

رویکردهای سیاسی واضح و قاطعی برای حفاظت و سازماندهی بهتر سرویس‌های گردهافشانی تاکنون در کشور مطرح نشده است، این در حالی است که همزمان با توسعه کشاورزی نوین به نگرش‌های منسجم و عملی برای حفاظت گردهافشان‌ها در سطح ملی و محلی نیاز جدی داریم. برای استفاده پایدار و حفاظت گردهافشان‌ها علاوه بر سیاست‌گذاری کلی در کشور به حمایت سازمانهای دولتی، شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و حتی اجتماعات کوچک محلی نیز نیاز است. در آموزش سطوح مختلف تحصیلی از جمله تحصیلات رسمی و غیر رسمی توجه بسیار ناچیزی به این‌ها می‌شود. بنابر این برای افزایش آگاهی‌های عمومی در جهت حفاظت و ساماندهی مناسب سرویس‌های گردهافشان بايستی برنامه آموزشی لازم تهیه شود. در

جدول ۱- دانستن رفتار تولیدمثلى و مکانیسم‌های کنترل گردهافشانی برای احیاء و تولید بذر محصولات کشاورزی مهم است

محصول	گونه	رفتار گردهافشانی (درصد دگر لفاحی)	مکانیسم گردهافشانی	روش احیاء
بیونجه	<i>Medicago sativa</i>	عمدتاً دگر گشن (۸۴-۹۴ درصد)	جدا بی، فرار گیری کندو زنبور	جدا بی، پاکت گذاری
تاج خروس	<i>Amaranthus spp.</i>	دگر گشن	باد	جدا بی، پاکت گذاری
جو	<i>Hordeum vulgare</i>	خود گشن	حشرات	پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
کدو قیلانی	<i>Lagerania siceraria</i>	دگر گشن، یک پایه	حشرات	پاکت گذاری
خردل	<i>Brassica juncea</i>	عمدتاً خود گشن (۱۴-۴ درصد دگر گشن)	باد	پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
گندم سیاه	<i>Fagopyrum esculentum</i>	دگر گشن، خود ناساز گار	باد	پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
خورنال	<i>Cenchrus ciliaris</i>	دگر گشن	باد	پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
کلم	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	دگر گشن	حشرات	فارگیری کندو زنبور
هویج	<i>Ducus carota</i>	دگر گشن، بروتاندروس	حشرات	فارگیری کندو زنبور
کرچک	<i>Ricinus communis</i>	دگر گشن، یک پایه	باد	پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
کلم گل	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	عمدتاً دگر گشن	حشرات	پاکت گذاری
نخود	<i>Cicer arietinum</i>	خود گشن	حشرات	جدا بی مکانی، پاکت گذاری، قفس های غیر قابل نفوذ به حشرات
کاسنی	<i>Cichorium intybus</i>	دگر گشن، بشدت خود ناساز گار	حشرات	جدا بی، پاکت گذاری، قفس های غیر قابل نفوذ به حشرات
لوپیا	<i>Phaseolus vulgaris</i>	عمدتاً خود گشن (۲۰-۸ درصد دگر گشن)	حشرات	پاکت گذاری، قفس های غیر قابل نفوذ به حشرات
پنبه	<i>Gossypium spp.</i>	عمدتاً خود گشن (۵۰-۱۰ درصد تلاقی طبیعی)	حشرات	جدا بی مکانی، پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
لوپیای چشم بلبلی	<i>Vigna unguiculata</i>	عمدتاً خود گشن	حشرات	جدا بی مکانی، پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
خوار	<i>Cucumis sativus</i>	دگر گشن	حشرات	جدا بی، پاکت گذاری
بادمجان	<i>Solanum melongena</i>	تا اندازه ای خود گشن، تا ۴۸ درصد تلاقی طبیعی	حشرات	جدا بی، پاکت گذاری
باقلاء	<i>Vicia faba</i>	عمدتاً خود گشن (۴-۸ درصد امکان تلاقی طبیعی)	حشرات	جدا بی، پاکت گذاری
ارزن دم رویاهی	<i>Setaria italica</i>	خود گشن	حشرات	پاکت گذاری، گردهافشانی با دست
خرل	<i>Lathyrus sativus</i>	خود گشن، سطوح قابل توجهی از دگر گشنی می تواند رخد دهد		
کاهو	<i>Lactuca sativa</i>	عمدتاً خود گشن (دگر گشنی طبیعی ۱-۶ درصد)		
لوپیای چیتی	<i>Phaseolus lunatus</i>	عمدتاً خود گشن (تا ۱۸ درصد تلاقی طبیعی)		
کان	<i>Linum usitatissimum</i>	به طور معمول خود گشن، تلاقی طبیعی تا ۱۲ درصد		
ذررت	<i>Zea mays</i>	دگر گشن، یک پایه		
			پاکت گذاری و گردهافشانی با دست از خزانه گرده	

ادامه جدول ۱

محصول	گونه	رفتار گرده افشاری (در صد دگر لقاحی)	مکانیسم گرده افشاری	روش احیاء
ماش	<i>Vigna radiata</i>	خود گشن		
بولاف، جو دوسر	<i>Avena sativa</i>	خود گشن		
پیاز	<i>Allium cepa</i>	عمدتاً دگر گشن، پروتاندروس		
نخود فرنگی	<i>Pisum sativum</i>	عمدتاً خود-گشن		
بادام زمینی	<i>Arachis hypogaea</i>	خود-گشن		
ارزن مرواریدی	<i>Pennisetum glaucum</i>	عمدتاً دگر گشن، پروتوژینوس		
فلفل	<i>Capsicum annum</i>	غلب دگر گشن، ناجور خامه		
سبب زمینی	<i>Solanum tuberosum</i>	عمدتاً دگر گشن		
کدو حلوا بی	<i>Cucurbita moschata</i>	دگر گشن، یک پایه		
ترب	<i>Raphanus sativus</i>	دگر گشن، بشدت خودناساز گار		
شبدر قرمز	<i>Trifolium pratense</i>	دگر گشن، بشدت خودناساز گار		
برنج	<i>Oryza sativa</i>	خود گشن		
چاودار	<i>Secale cereale</i>	دگر گشن، بشدت خودناساز گار		
چجم	<i>Lolium perenne</i>	دگر گشن		
گلرنگ	<i>Carthamus tinctorius</i>	خود گشن		
کجد	<i>Sesamum indicum</i>	عمدتاً خود گشن (تا ۵ درصد دگر گرده افشاری)		
سور گوم	<i>Sorghum bicolor</i>	عمدتاً خود گشن (۱۰ تا ۵۰ درصد دگر گرده افشاری)		
سویا	<i>Glycine max</i>	خود گشن		
اسفناج	<i>Spinacea oleracea</i>	دگر گشن، دوبایه		
توت فرنگی	<i>Fragaria ananassa</i>	عمدتاً دگر گشن		
چغندر	<i>Beta vulgaris</i>	دگر گشن، خودناساز گار		
آتابگردان	<i>Helianthus annus</i>	تا اندازه‌ای دگر گشن، پروتاندروس		
شبدر شیرین، یونجه	<i>Melilotus albus</i>	خود گشن		
زرد	<i>Nicotina tabacum</i>	خود گشن		
تونون	<i>Lycopersicum esculentum</i>	به طور معمول خود گشن، برخی از گونه‌ها خودناساز گار با دگر گشنی بالا		
گوجه فرنگی	<i>Vicia sativa</i>	خود گشن		
ماشک	<i>Citrullus lanatus</i>	دگر گشن، یک پایه		
هندوانه	<i>Triticum aestivum</i>	خود گشن		
گندم				

نخودفرنگی، بادام زمینی، گلرنگ، سورگوم، سویا، شبدر شیرین، توتون، گوجه فرنگی و ماشک کاملا خودگشن یا تا حدودی دگرگشن هستند (۶، ۷، ۱۰ و ۲۳).

توصیه ترویجی

با توجه به اهمیت دانستن نوع گردهافشانی محصولات کشاورزی در تولید بذر در مطالعات بهزادی گیاهان زراعی، باگی و دارویی، و یا برنامه‌های تولید بذر اطلاح شده در موسسات تحقیقاتی و یا حتی تولید بذر توسط کشاورزان، توصیه می‌شود براساس جدول بالا با توجه به نوع گردهافشانی و روش احیا و نوع گردهافشان مربوطه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا علاوه بر افزایش تولید بذر در واحد سطح، میزان یکنواختی و خلوص ژنتیکی آنها نیز بهبود یابد.

۱- حشرات نوش‌خوار: این دسته از حشرات را بیشتر زنبورها و پروانه‌ها که برای استفاده از نوش گل سبب گردهافشانی می‌شوند تشکیل می‌دهند (۳، ۵، ۱۴ و ۱۵).

جدول ۱ رفتار تولید مثلى و مکانیسم‌های کنترل گردهافشانی برای احیاء و تولید بذر را در محصولات مهم کشاورزی نشان داده است. همانطوری که در جدول مشخص شده است محصولاتی مثل یونجه، شبدر، کدو، کلم، هویج، کرچک، کاسنی، خیارف ذرت، پیاز، ارزن مرواریدی، فلفل، ترب، چاودار چشم، کنجد، اسفناج، توت فرنگیف پغندر، افتتابگردان و هندوانه دگرگشن یا تا حدودی خودگشن هستند. و گیاهانی مثل جو، گندم، برنج، خردل، نخود، لوبيا، پنبه، بادمجان، باقلاء، ارزن دم روپاهی، خلر، کاهو، کتان، ماش، یولاف،

منابع

۱- خمسه ن خ، قنواتی ف، جنوبی پ، مجد ا، امیرآبادی زاده ح (۱۳۹۰) بررسی سیستم تولید مثلى در برخی از گونه‌های جنس *Onobrychis*. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. ۱۰ و ۱۱ شهریور

مشهد

۲- خمسه ن خ، قنواتی ف، جنوبی پ، مجد ا، نعمت پژوه ن (۱۳۹۰) بررسی سیستم گردهافشانی در جنس *Onobrychis*. همايش ملی تغيير اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ۲ مرداد. ارومیه

۳- قنواتی ف، خمسه ن خ (۱۳۹۱) مطالعه سیستم تولید مثلى و گردهافشانی برخی از گونه‌های *Onobrychis*. مجله بهزادی نهال و بذر ۱-۲۸ (۲): ۲۷۵-۲۵۵

۴- قنواتی ف، مظفری ج (۱۳۸۷) نقش گرده افشانها در امنیت غذایی و تنوع زیستی. صفحات ۲۶-۲۱. مجموعه مقالات کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران. تهران، ایران

۵- قهرمان، ۱ (۱۳۸۱) گیاه‌شناسی پایه جلد ۱ و ۲ . انتشارات دانشگاه تهران. ۵۰۰ صفحه

6. **Agbagwa I, Obute G (2007)** Breeding system and pollination ecology of two *Abrus* species (Fabaceae) from tropical West Africa-Acta Bot. Croat. 66 (2), 205-216
7. **Arroyo MTK (1981)** Breeding systems and pollination biology in Leguminosae. In: Polhill R. M., Raven P. H. (eds.) Advances in legume systematics. Part 2. Royal Botanical Garden, Kew, pp. 723–769
8. **Braulio SF, Dias A, Raw V, Imperatriz -Fonseca L (1999)** The São Paulo declaration on pollinators. Report on the recommendations of the workshop on the conservation and sustainable use of pollinators in agriculture with emphasis on bee. Brazilian Ministry of the Environment. 70p.
9. **Buchmann SL, Nabhan GP (1996)** The Forgotten pollinators. Island Press, Washington, D. C. Shearwater Books, Covelo, California. 320 pp.
10. **Bullita S, Floris R, Hayward MD, Veronesi F (1993)** The reproductive system of a *Lolium rigidum* Gaud. Population from Sardinia and its implication for breeding. Plant Breed. 111: 312–317
11. **Cruden RW (2000)** Pollen grains: why so many? Pl. Syst. Evol. 222: 143–165
12. **Dafni A (1992)** Pollination ecology: a practical approach. Oxford University Press, Oxford. 210p.
13. **Eardley C, Roth D, Clarke J, Buchmann S, Gemmill B (2006)** Pollinators and pollination: A resource book for policy and practice (first edition) published by the African Pollinator Initiative (API). 153p.
14. **Edlund A, Swanson R, Preuss D (2004)** Pollen and stigma structure and function: The role of diversity in pollination. The Plant Cell 16 (1) S84-S97
15. **Faegri K, Van Der Pijl L (1979)** The principles of pollination biology. 3rd edition, Pergamon Press, Oxford, 244p.
16. **FAO (2008)** A Contribution to the international initiative for the conservation and sustainable use of pollinators rapid assessment of pollinators' status January. 95p.
17. **Galloni M, Podda L, Vivarelli D, Cristofolini G (2007)** Pollen presentation, pollen-ovule ratios, and other reproductive traits in Mediterranean Legumes (Fam. Fabaceae - Subfam. Faboideae). Pl. Syst. Evol. 266: 147–164
18. **Hiscock SJ, McInnis SM (2003)** The diversity of self-incompatibility systems in flowering plants. Plant Biol. 5: 23-32
19. **McGregor SE (2009)** Insect pollination of cultivated crop plants. USDA. Online //E/|Jason/book/chap9/tung.html (4 of 4) [1/21/2009 3:47:41 PM]
20. **Nabhan GP (1996)** Pollinator redbook: Global list of treated vertebrate wildlife species serving as pollinators for crops and wild plants. Arizona-Sonora desert museum and forgotten pollinators campaign monographs. Tucson, Arizona, 3 (1) 235-242
21. **Peter GK, Truman TPh (2001)** the economic impacts of pollinator declines: an approach to assessing the consequences. 18p.
22. **Pimentel D, Wilson C, McCullum C, Huang R, Dwen P, Flack J, Tran Q, Saltman T, Cliff B (1997)** Economics and environmental benefits of biodiversity. bioScien 47 (11): 747-757
23. **Rao NK, Hanson J, Dulloo ME, Ghosh K, Nowell D and Larinde M (2006)** Manual of seed handling in genebanks. Handbooks for Genebanks No. 8. Bioversity International, Rome, Italy. 154p
24. **Silva NF, Goring DR (2001)** Mechanisms of self-incompatibility in flowering plants. Cell. Mol. Life Sci. 58: 1988-2007

25. **Southwick EE, Southwick L (1992)** Estimating the economic value of honey bees (*Hymenoptera: Apidae*) as agricultural pollinators in the United States. *J. Econ. Entom.* 85: 621-633